

¿Qué es un histerosalpingograma?

Un histerosalpingograma (HSG) es un procedimiento radiológico que se realiza para mostrar la anatomía de las trompas de Falopio y la cavidad uterina, con el fin de determinar si su apariencia es normal. Este estudio se hace con frecuencia para saber si las trompas están abiertas y sin obstrucciones. El HSG suele ser solicitado por el médico como parte de una evaluación de fertilidad, pero no es en sí una prueba de fertilidad.

El HSG puede revelar anomalías del útero, así como complicaciones en las trompas, como obstrucción y dilatación (hidrosálpinx). Si se planea una reversión de la esterilización, se puede identificar el punto donde las trompas están bloqueadas, lo que ayuda a planear el proceso de reconstrucción.

Si las trompas no están bloqueadas por tejido cicatricial o adherencias, el medio de contraste fluirá hacia la cavidad abdominal. Esto es una buena señal, pero no garantiza que las trompas funcionen normalmente. Sí da una idea general de la calidad de la estructura de las trompas y del estado de su revestimiento interno.

El HSG también puede identificar pólipos endometriales, miomas uterinos, adherencias intrauterinas (tejido cicatricial dentro del útero) o anomalías en la cavidad uterina. El estudio puede o no detectar adherencias pélvicas, pólipos pequeños, endometriosis, obstrucción parcial de las trompas de Falopio u otras anomalías.

VENTAJAS DE ARA

Atención excepcional al paciente
Se acepta y procesa la mayoría de planes de seguro
Horarios de atención flexibles
Estacionamiento accesible para discapacitados

**AUSTIN CENTER BOULEVARD
& ACB WOMEN'S IMAGING**
6818 Austin Center Blvd., Suite 101
Austin, TX 78731
(512) 795-8505

**CEDAR PARK &
CEDAR PARK WOMEN'S IMAGING**
12800 W. Parmer Lane, Suite 200
Cedar Park, TX 78613
(512) 485-7199

DRIPPING SPRINGS
170 Benney Lane, #101, Suite 101
Dripping Springs, TX 78620
(512) 776-1176

GEORGETOWN
3201 S. Austin Avenue, Suite 105
Georgetown, TX 78626
(512) 863-4648 or
(512) 519-3441

**KYLE &
KYLE WOMEN'S IMAGING**
4211 Benner Road, Suite 100
Kyle, TX 78640
(512) 776-1150

LEANDER
10861 183A Frontage Rd, Bldg 1
Leander, TX 78641
(512) 485-1575

MANOR
12700 Lexington St., Suite 300
Manor, TX 78653
(512) 776-1158

MEDICAL PARK TOWER
1301 W. 38th Street, Suite 118
Austin, TX 78705
(512) 454-7380

MIDTOWN
901 W. 38th Street, Suite 100
Austin, TX 78705
(512) 519-3456

**MUELLER & MUELLER CHILDREN'S
IMAGING CENTER**
1301 Barbara Jordan Blvd.
Suite 104
Austin, TX 78723
(512) 480-0761

★ **QUARRY LAKE**
4515 Seton Center Parkway
Suite 105
Austin, TX 78759
(512) 519-3402

RIATA
12554 Riata Vista Circle
Austin, TX 78727
(512) 795-5100

ROCK CREEK PLAZA
2120 N. Mays
Suite 220
Round Rock, TX 78664
(512) 238-7195

SAN MARCOS
1348 B Texas 123 South
San Marcos, TX 78666
(512) 392-1831 or
(888) 261-2149

SOUTHWEST MEDICAL VILLAGE
5625 Eiger Road
Suite 165
Austin, TX 78735
(512) 519-3475

SOUTHWOOD
1701 W. Ben White Blvd., Suite 170
Austin, TX 78704
(512) 428-9090

★ **WESTLAKE**
5656 Bee Caves Road
Building H, Suite 200
Austin, TX 78746
(512) 328-4984

WILLIAM CANNON
2501 W. William Cannon Drive
Building 5
Austin, TX 78745
(512) 346-7311

WILSON PARKE
11714 Wilson Parke Ave., Suite 175
Austin, TX 78726
(512) 519-3457

★ Locations offering HSG

Examen HSG

Lo que necesitas saber sobre tu examen de histerosalpingografía



ARA
DIAGNOSTIC IMAGING

Oct 2026

CITAS
(512) 453-6100

REFERENCIAS POR FAX
(512) 836-8869

ausrad.com

ARA
DIAGNOSTIC IMAGING



¿Por qué se realiza el estudio de histerosalpingograma (HSG)?

El HSG se realiza para:

- Detectar una trompa de Falopio bloqueada, con frecuencia en mujeres que tienen dificultad para embarazarse. Las cicatrices en las trompas pueden bloquearlas y evitar el embarazo.
- Identificar problemas del útero, como una forma o estructura anormal, pólipos, miomas, adherencias o algún objeto extraño en el útero. Este tipo de problemas puede causar menstruaciones dolorosas o abortos espontáneos repetidos.
- Determinar el éxito de una ligadura de trompas.
- Verificar si una cirugía para revertir la ligadura de trompas ha sido exitosa.

¿El HSG mejora la fertilidad?

Aunque algunas mujeres han logrado embarazarse después de un HSG, su propósito es únicamente diagnóstico y no terapéutico.

¿Cómo debo prepararme para el estudio?

Dependiendo de su diagnóstico, puede que necesite tomar antibióticos para prevenir una posible infección, y antes del procedimiento podría tomar un medicamento antiinflamatorio. El estudio se realiza entre el día 7 y 10 de su ciclo menstrual. Para asegurarse de que no esté embarazada, también deberá abstenerse de tener relaciones sexuales desde el primer día de su ciclo hasta el día del procedimiento HSG.

Antes de un HSG, por favor infórmenos si usted:

- Está o pudiera estar embarazada.
- Tiene actualmente una infección pélvica (enfermedad inflamatoria pélvica) o una enfermedad de transmisión sexual.
- Es alérgica al yodo que se utiliza en el medio de contraste. También avísenos si es alérgica a algún medicamento o si alguna vez ha tenido una reacción alérgica grave (anafilaxia).
- Tiene problemas de sangrado o toma medicamentos anticoagulantes como aspirina o warfarina (Coumadin).

¿Qué sucede durante el estudio?

Antes del examen, un tecnólogo le explicará el procedimiento a detalle y responderá cualquier pregunta que tenga. El inicio del estudio es muy similar a un examen pélvico de rutina. Después de vaciar la vejiga, se le pedirá que se acueste en una mesa de exploración bajo un fluoroscopio (equipo de rayos X), en una posición similar a la de un examen pélvico. El tecnólogo o radiólogo examinará su útero y colocará un espéculo en la vagina. Una vez que el cuello uterino esté limpio, se insertará un pequeño tubo en la abertura del cuello

uterino o se colocará una pequeña copa de succión, dependiendo de lo que sea mejor para usted.

El útero se llenará suavemente con un medio de contraste para delinear el canal cervical, el útero y las trompas de Falopio. En ese momento se podrán ver cualquier anomalía en la cavidad uterina o en las trompas. Se tomarán radiografías y luego se retirarán los instrumentos. Con frecuencia se obtienen imágenes desde los lados pidiéndole que cambie de posición en la mesa. Puede presentarse cólico similar al menstrual; sin embargo, al retirar los instrumentos el dolor comenzará a disminuir y generalmente desaparece en unos 15 minutos. El procedimiento dura entre 15 y 30 minutos. Podrá regresar a sus actividades normales inmediatamente después.

Para programar una cita, por favor visite ausrad.com o llame a nuestro departamento de programación al (512) 453-6100.

