

ARA
DIAGNOSTIC IMAGING



UBICACIONES

Por favor, haga los arreglos necesarios para la supervisión de los menores que acompañen al paciente, aparte del paciente.

- ☐ Abdomen organs complete
- ☐ Abdomen limited: RUQ
- ☐ Abdomen limited: intussusception
- ☐ Appendix
- ☐ Liver elastography
- ☐ Abdomen Doppler
- ☐ Pylorus
- ☐ Abdomen wall for hernia
- ☐ Umbilical / urachal
- ☐ Renal / bladder
- ☐ Adrenal
- ☐ Pelvic (transabdominal only)
 - ☐ w Doppler to r/o torsion
- ☐ Venous Doppler
 - ☐ R ☐ L ☐ Arm ☐ Leg
- ☐ Thyroid
- ☐ Neck
- ☐ Testicular w Doppler
- ☐ Undescended testes
- ☐ Breast ☐ R ☐ L
- ☐ Cranial
 - (anterior fontanel must be open)
- ☐ Head - soft tissue
- ☐ Hip (less than 6 months)
- ☐ Spine (less than 4 months)
- ☐ Extremity (specify):

- ☐ Other (specify):

ULTRASONIDO ABDOMINAL, DEL BAZO, DEL PÁNCREAS, DEL RETROPERITONEO Y DE LA VESÍCULA BILIAR

1. 0 a 2 años: Nada de comer o tomar 3 horas antes de la hora del examen.
2. 3 a 16 años: Nada de comer o tomar 6 horas antes de la hora del examen.

ULTRASONIDO DE LAS CADERAS / ULTRASONIDO CRANEAL Y DE LA COLUMNA

1. Nada de comer o tomar 3 horas antes de la hora del examen.
2. Traiga un biberón para alimentar al paciente durante el examen, o, si está en período de lactancia, llegue temprano para alimentarse inmediatamente antes del examen.
3. El ultrasonido de la columna no es apropiado después de 4 meses de edad.
4. El ultrasonido de la cadera no es apropiado después de 6 meses de edad.

ULTRASONIDO DEL PÍLORO

1. Nada de comer o tomar 3 horas antes de la hora del examen.
2. Si es URGENTE, no le alimente al paciente después de que se programe el examen.
3. Si el examen es normal, determine si se sigue con un examen del tracto gastrointestinal superior.

ULTRASONIDO RENAL, PÉLVICO Y DE LA VEJIGA

1. 0 a 2 años: Alimentarle 30 minutos antes de la hora del examen.
2. 3 a 4 años: Darle 2 vasos llenos de líquido sin gas, 30 minutos antes de la hora del examen.
3. 5 a 8 años: Darle 3 vasos llenos de líquido sin gas, 30 minutos antes de la hora del examen.
4. 9 a 16 años: Darle 4 vasos llenos de líquido sin gas, 30 minutos antes de la hora del examen.
5. LA PACIENTE DEBE LLEGAR CON LA VEJIGA LLENA.

TODOS LOS OTROS EXÁMENES CON ULTRASONIDO

1. 0 a 3 años: Nada de comer o tomar 3 horas antes de la hora del examen.
2. Traiga un biberón para alimentar al paciente durante el examen.
3. De 4 años de edad en adelante no se necesita preparación.

PARA TODOS LOS EXÁMENES, ADMINISTRE TODOS LOS MEDICAMENTOS CON TAN POCA AGUA COMO SEA POSIBLE.



PROGRAMAR



UBICACIONES